

# ПРОГРАМА ПІДЖИВЛЕНЬ ЧАСНИК - ЦИБУЛЯ



## ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ

СТАДІЯ РОСТУ	ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	РОЗВИТОК ЛИСТЯ	ПОТОВЩЕННЯ ОСНОВНОГО ЛИСТЯ	РОЗВИТОК ЦИБУЛИН
МЕТА ВНЕСЕННЯ				
ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	<b>Tecamin Max</b> 2 л/га/обр. (1 обр.)			
ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ ЛИСТЯ ТА ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ		<b>Tecamin Max</b> 2 л/га/обр. (3 обр.) на 30, 45 та 60 дні після пересадки або появи сходів		

## КОРЕНЕВЕ ВНЕСЕННЯ

СТАДІЯ РОЗВИТКУ	ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	РОЗВИТОК ЛИСТЯ	ПОТОВЩЕННЯ ОСНОВНОГО ЛИСТЯ	РОЗВИТОК ЦИБУЛИН
МЕТА ВНЕСЕННЯ				
ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	<b>Tecamin Raiz</b> 10 мл/л, полив рослин або занурення коренів рослин перед висадкою  + <b>Tecamin Raiz</b> 3 л/га/обр. (1 обр.) через 10-15 днів після висадки			
ПОЛІПШЕННЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ		<b>Agriful</b> Всього 20 л/га, поділених на регулярні внесення протягом вегетаційного періоду		



ТЕКАМІН РАІС, 3  
ДНІ ПІСЛЯ  
ОБРОБКИ

Більш часті внесення з пониженими дозами краще, ніж поодинокі внесення з високими дозами.

Наведена інформація носить рекомендований характер.

Дозування повинно бути зменшене, якщо препарати вносяться одночасно в одну фазу розвитку рослин

За більш детальною інформацією звертайтеся до дистриб'ютора та технічного консультанта.

обр. = обробка