



ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ

СТАДІЯ РОЗВИТКУ	ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	ВЕГЕТАТИВНИЙ РОЗВИТОК	ПЕРЕД ЦВІТІННЯМ	ПІСЛЯ ЗАВ'ЯЗУВАННЯ ПЛОДІВ	РОЗВИТОК ПЛОДІВ	ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ
МЕТА ВНЕСЕННЯ						
ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ ЛИСТЯ & ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ПІСЛЯ ДІЇ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР		Tecamin Max 2 л/га/обр. (2 обр.)				

КОРЕНЕВЕ ВНЕСЕННЯ

СТАДІЯ РОЗВИТКУ	ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	ВЕГЕТАТИВНИЙ РОЗВИТОК	ПЕРЕД ЦВІТІННЯМ	ПІСЛЯ ЗАВ'ЯЗУВАННЯ ПЛОДІВ	РОЗВИТОК ПЛОДІВ	ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ
МЕТА ВНЕСЕННЯ						
ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	Tecamin Rabz 10 мл/л, занурення коренів рослин перед висадкою + Tecamin Rabz 3 л/га/обр. (1 обр.) через 10-15 днів після висадки					
ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ		Agriful 3-5 л/га/щотижня. Всього 40-70 л/га за вегетаційний період				
ПОЛІПШЕННЯ ЦВІТІННЯ ТА ЗАВ'ЯЗУВАННЯ ПЛОДІВ		Agriful	Agriful			
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЛОДІВ				Agriful	Agriful	
ОПТИМАЛЬНЕ ДОЗРІВАННЯ ПЛОДІВ					Agriful	Agriful

Більш часті внесення з пониженими дозами краще, ніж поодинокі внесення з високими дозами.

Наведена інформація носить рекомендований характер.

Дозування повинно бути зменшене, якщо препарати вносяться одночасно в одну фазу розвитку рослин

За більш детальною інформацією звертайтеся до дистриб'ютора та технічного консультанта.

обр. = обробка